

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕТРАЛЕКСА ПРИ ОСТРОМ ГЕМОРРОЕ

ЦЕЛЬ:



Оценить клиническую эффективность Детралекса при остром геморрое

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ:


- Двойное слепое, плацебо контролируемое.
- 100 пациентов с острым геморроидальным приступом (<24 часов).
- ДЕТРАЛЕКС 1000г или плацебо 7 дней: первые 4 дня по 3 таблетки, следующие 3 дня по 2 таблетки.
- Разрешалось применять анальгетики или местный анестетик.

Критерии оценки:


- Динамика симптомов в баллах.
- Прием анальгетиков и местных анестетиков

РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество больных с ремиссией (без боли и кровотечений)



Число таблеток анальгетиков, принимаемых в день (среднее)



ДЕТРАЛЕКС обеспечивает быстрое и значительное:

- уменьшение признаков и симптомов острого геморроя (проктит, боль, кровоточивость, анальные выделения):
 - на 2 день у 42% пациентов (6% с плацебо)
 - на 3 день у 76% пациентов (36% с плацебо)
 - на 7 день у 89% пациентов (38% с плацебо)
- уменьшение воспаления и отека у 94% пациентов (58 % с плацебо),
- уменьшение приема анальгетиков, начиная со 2-го дня.